

HPV è

**un'abbreviazione e sta per
Human Papilloma Virus**

è un virus diffuso

L'infezione da HPV è l'infezione sessualmente trasmissibile più comune in Svizzera e in tutto il mondo.

80%



Quasi tutte le persone, a un certo punto della loro vita, vengono infettate dall'HPV.

L'HPV si diffonde attraverso il contatto intimo della pelle, principalmente durante i rapporti sessuali.




La maggior parte delle persone non si rende nemmeno conto di aver contratto un'infezione da HPV e quindi può inconsapevolmente trasmettere l'HPV ad altre persone.

Attualmente sono noti più di 200 tipi diversi di HPV.




La maggior parte delle infezioni da HPV non causa alcun sintomo e scompare da sola.

Alcuni "tipi di HPV" possono causare verruche genitali.



È possibile che le verruche genitali guariscano da sole, ma ciò può richiedere diversi anni.

"Tipi di HPV ad alto rischio" possono causare lesioni precancerose e il cancro.



Cancro testa-collo

Cancro testa-collo

Cancro del pene

Cancro della cervice

Verruche genitali

Cancro della vagina

Cancro dell'ano

Cancro della vulva

Verruche genitali

Cancro dell'ano

L'HPV è meglio conosciuto per essere la causa del cancro della cervice, ma può anche causare altri tumori e malattie.

In Svizzera, le malattie legate all'HPV sono frequenti:



Malattie per anno

25 000	Verruche genitali
5 000	Conizzazioni associate all'HPV
3 000	In stadi precancerosi avanzati di cancro della cervice (possono comportare infertilità e aborti)
250	Cancro della cervice (con sequele del trattamento)
160	Cancro dell'ano (donne e uomini)

Decessi per anno

80	Cancro della cervice
40	Cancro dell'ano



Dei controlli regolari e dei programmi di prevenzione esistono solamente per il tumore del collo dell'utero, ma non per altri tipi di tumori legati all'HPV.

Purtroppo vengono sovente diagnosticati quando causano altri problemi di salute.

La vaccinazione contro l'HPV protegge dalle infezioni che possono portare a vari tipi di cancro e alle verruche genitali.



Riduzione del rischio di cancro cervicale invasivo

Età per la
vaccinazione:
<17 anni

88%



Età per la
vaccinazione:
17-30 anni

53%



2 dosi di vaccino anti-HPV
fino a **14** anni di età



3 dosi di vaccino anti-HPV a
partire da **15** anni di età

Domande frequenti sull'HPV:

Sono un ragazzo; perché dovrei farmi vaccinare contro l'HPV?

Anche gli uomini possono essere colpiti da malattie associate all'HPV e da verruche genitali. Inoltre, puoi proteggere il tuo/la tua partner.

Sono abbastanza grande per essere vaccinato?

È meglio vaccinarsi il prima possibile, cioè a partire dall'età di 11 anni, poiché in questa fascia di età non si è ancora stati infettati e il corpo reagisce meglio alla vaccinazione. Se ti fai vaccinare prima dei 15 anni, sono sufficienti anche due vaccinazioni invece di tre.

In quale parte del corpo si fa il vaccino? Fa male?

È solo una puntura nella parte superiore del braccio. È uguale alle vaccinazioni che hai fatto finora.

Posso prendere l'HPV tramite il vaccino?

No. No. Il vaccino contiene particelle che imitano l'HPV, ma non contiene virus vivi e non può causare infezioni.

Quali sono i possibili effetti collaterali del vaccino anti-HPV?

Di solito la vaccinazione è ben tollerata. Si può manifestare arrossamento o gonfiore nelle sede di iniezione o avere dolore nei giorni successivi alla vaccinazione anti-HPV. A volte vi può essere un aumento della temperatura, nausea, cefalea o affaticamento.

**L'HPV colpisce tutti,
direttamente o indirettamente.**

**Scopri come puoi
proteggerti.**

Trovi maggiori informazioni su: www.hpv.info.ch

