

## Brochure pour patient(e)s recevant un traitement par WELIREG<sup>®</sup>



Informations pour les patient(e)s ainsi que leurs proches

Cette brochure est destinée aux patient(e)s à qui on a prescrit WELIREG.

Cette brochure ne remplace pas une consultation chez le médecin.

En cas de questions sur le traitement, veuillez vous adresser à votre médecin traitant.

# **Chers patientes et patients, Chers proches,**

Dans cette brochure, nous souhaitons vous présenter WELIREG. WELIREG est un médicament utilisé chez les adultes atteints de la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) ainsi que dans certaines formes de cancer du rein avancé.

WELIREG est un inhibiteur du facteur 2-alpha induit par l'hypoxie (HIF-2α). Cette protéine aide à contrôler la croissance des cellules et des vaisseaux sanguins, ce qui peut jouer un rôle dans le développement et la propagation des tumeurs dans l'organisme.

## **WELIREG peut aider à garder le contrôle sur certaines tumeurs associées à la VHL ainsi que sur certaines formes de cancer du rein.**

Dans cette brochure, vous trouverez des informations sur WELIREG, les effets secondaires possibles et le soutien qui vous est proposé pendant le traitement. Cette brochure ne se substitue pas à un entretien médical mais doit vous aider à prendre la meilleure décision de traitement possible avec votre médecin.

Le traitement des tumeurs peut constituer un défi. Mais vous n'êtes pas seul(e): il existe de nombreuses ressources et organisations qui peuvent vous aider. Discutez avec votre médecin des possibilités de soutien disponibles et n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes concernées.

Nous espérons que cette brochure vous encouragera à faire face aux défis liés à votre maladie et vous souhaitons beaucoup de succès dans votre traitement avec WELIREG.

## **Meilleures salutations,**

Votre équipe MSD

MSD Merck Sharp & Dohme AG, Lucerne, Suisse

# Contenu

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Comment utiliser WELIREG?                                    | Page <b>5</b>  |
| Conseils sur le traitement avec WELIREG                      | Page <b>6</b>  |
| À quoi faut-il faire attention avant de prendre WELIREG?     | Page <b>7</b>  |
| Grossesse et contraception pendant le traitement par WELIREG | Page <b>9</b>  |
| Quels effets secondaires WELIREG peut-il provoquer?          | Page <b>10</b> |
| Votre carte de patient WELIREG                               | Page <b>11</b> |



# Comment utiliser WELIREG?

## La dose recommandée de WELIREG est:



120 mg (trois comprimés de 40 mg) à avaler chaque jour à la même heure, **pendant ou en dehors des repas**.

## À quoi faut-il faire attention avant de prendre WELIREG?



Prenez WELIREG en suivant exactement les indications de votre médecin.



Prenez la dose qui vous a été prescrite une fois par jour, toujours à la même heure. Il est possible que votre médecin adapte la dose recommandée.



**Ne mâchez pas les comprimés et ne les écrasez pas en petits morceaux;** vous devez avaler chaque comprimé en entier.

## Que faire si vous avez oublié d'utiliser WELIREG ou si vous avez utilisé plus de WELIREG que vous auriez dû

- Si vous avez oublié une dose de WELIREG, prenez-la dès que possible le jour même. Le lendemain, prenez la dose suivante de WELIREG à l'heure habituelle. Ne prenez pas de comprimés supplémentaires pour compenser la dose oubliée.
- Ne prenez pas de dose supplémentaire de WELIREG si vous avez vomi après avoir pris le médicament. Le lendemain, prenez la dose suivante à l'heure habituelle.
- Si vous avez pris trop de comprimés, demandez conseil à un médecin ou à un hôpital. Il se peut qu'une prise en charge médicale soit nécessaire.

# Conseils sur le traitement avec WELIREG

Les expériences avec la prise de WELIREG sont très différentes d'une personne à l'autre. Les conseils suivants peuvent toutefois vous aider.



## **Si vous remarquez quelque chose, signalez-le**

Informez votre médecin si vous constatez un effet secondaire qui vous gêne ou qui ne disparaît pas.



## **Si vous vous sentez fatigué(e)**

Demandez de l'aide si vous en avez besoin et parlez-en à votre équipe soignante, à vos amis et à votre famille.



## **Mangez sainement**

Essayez de manger chaque jour 2 à 3 portions de fruits et légumes et évitez les aliments riches en graisses.



## **Essayez de rester actif(-ve)**

Demandez à votre équipe soignante comment vous pouvez intégrer des activités qui vous font du bien.



# À quoi faut-il faire attention avant de prendre WELIREG?

## Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre WELIREG si vous:

- souffrez de difficultés respiratoires
- avez des problèmes cardiaques
- avez un faible taux de globules rouges (anémie)
- prenez des agents stimulant l'érythropoïèse (ASE) pour traiter une anémie
- êtes enceinte ou envisagez une grossesse

## WELIREG peut influencer le mode d'action d'autres médicaments. Par exemple:

- les contraceptifs hormonaux comme le désogestrel, l'éthinylestradiol et le lévonorgestrel. L'administration simultanée de WELIREG peut causer l'échec de la contraception ou une augmentation des saignements survenant en dehors des règles.
- les somnifères contenant le principe actif midazolam. L'administration simultanée de WELIREG peut diminuer l'efficacité du midazolam.

Votre médecin décidera s'il est nécessaire d'adapter la dose que vous prenez.



# Grossesse et contraception pendant le traitement par WELIREG

## Atteinte potentielle pour votre enfant à naître

Le traitement par WELIREG au cours de la grossesse peut être nocif pour votre enfant à naître.

## Pour les femmes en âge de procréer

- Avant le début de votre traitement par WELIREG, votre médecin procédera à un test de grossesse.
- Pendant le traitement par WELIREG et pendant au moins 1 semaine après votre dernière dose, vous devez utiliser une forme de contraception non hormonale hautement efficace.
- Il se peut que les méthodes de contraception hormonale (comme la pilule contraceptive, les injections ou les patchs transdermiques) aient une efficacité limitée pendant le traitement par WELIREG.
- Demandez à votre médecin les méthodes contraceptives qui pourraient vous convenir pendant le traitement par WELIREG.
- Consultez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte ou si vous pensez que vous pourriez être enceinte pendant le traitement par WELIREG.

## Pour les patients masculins ayant une partenaire en âge de procréer

- Pendant le traitement par WELIREG et pendant au moins 1 semaine après votre dernière dose, vous devez utiliser un contraceptif hautement efficace.
- Consultez immédiatement votre médecin si votre partenaire tombe enceinte ou si elle pense qu'elle pourrait être enceinte pendant votre traitement par WELIREG.

WELIREG peut affecter la fertilité des hommes et des femmes, ce qui signifie que votre capacité à avoir des enfants peut être compromise. Consultez votre médecin si vous avez des inquiétudes à ce sujet.

## Quels effets secondaires WELIREG peut-il provoquer?

**Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.**

| Fréquence                                     | Effet secondaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Très fréquent<br>(>1 utilisateur sur 10)      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diminution du nombre de globules rouges (anémie)</li><li>• Fatigue/épuisement</li><li>• Étourdissements</li><li>• Difficultés à respirer</li><li>• Nausées</li><li>• Taux d'oxygène inhabituellement bas dans le sang</li><li>• Céphalées</li><li>• Problèmes lors de la défécation (constipation)</li><li>• Augmentation des valeurs de la fonction hépatique</li><li>• Douleurs dans les muscles, les os ou les articulations</li></ul> |
| Fréquent<br>(1 à 10 utilisateurs sur 100)     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prise de poids</li><li>• Glycémie élevée</li><li>• Pression artérielle élevée</li><li>• Vision trouble</li><li>• Éruption cutanée douloureuse accompagnée de vésicules remplies de liquide, causée par le même virus que celui de la varicelle (zona)</li><li>• Chute</li><li>• Fractures des os</li></ul>                                                                                                                                |
| Occasionnel<br>(1 à 10 utilisateurs sur 1000) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Décollement de la rétine ou occlusion veineuse rétinienne (modifications de la vision, y compris apparition de petits points noirs et d'éclairs, acuité visuelle réduite)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |

Si vous ressentez un ou plusieurs des effets secondaires indiqués ci-dessus, parlez-en à votre médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette brochure.

# Votre carte de patient WELIREG

## Observation des effets secondaires

Il est important de percevoir et de reconnaître les signes et symptômes de maladie.

Si vous constatez un quelconque trouble pendant ou après le traitement par WELIREG, contactez votre médecin ou consultez-le immédiatement. Veuillez noter que les effets secondaires peuvent aussi apparaître après la dernière dose de WELIREG.

N'essayez pas de diagnostiquer ni de traiter vous-même vos effets secondaires.

Il est important que vous informiez votre médecin dès que des troubles apparaissent. Gardez toujours sur vous votre carte de patient WELIREG, avec les coordonnées de votre médecin, afin que l'on puisse joindre celui-ci en cas d'urgence.

**Cette carte de patient contient des informations importantes** sur les symptômes qui doivent être immédiatement communiqués au médecin ou au personnel médical appelé à vous traiter alors que vous êtes en voyage. Elle informe aussi les autres médecins que vous êtes traité(e) avec WELIREG.

Cette brochure a été remise par

Cachet du cabinet

CH-BEL-00006, 07/2025

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA et ses filiales. Tous droits réservés.



**MSD**

**MSD Merck Sharp & Dohme AG**  
Werftstrasse 4, CH-6005 Lucerne  
T +41 58 618 30 30, msd.ch