

Opuscolo per pazienti che ricevono una terapia con **WELIREG**[®]



Informazioni per pazienti e loro parenti

Questo opuscolo si rivolge a pazienti ai cui è stato prescritto WELIREG.

Questo opuscolo non sostituisce la consultazione medica.

Per eventuali domande sul trattamento è necessario rivolgersi al proprio medico curante.

Care/i pazienti, cari parenti,

In questo opuscolo desideriamo presentarvi WELIREG. WELIREG è un medicinale per il trattamento degli adulti con malattia di Von Hippel-Lindau (VHL) nonché per alcune forme di carcinoma renale avanzato.

WELIREG è un inibitore del fattore inducibile dall'ipossia 2 alfa (HIF-2 α). Questa proteina aiuta a controllare la crescita delle cellule e dei vasi sanguigni, un processo che può svolgere un ruolo nello sviluppo e nella diffusione dei tumori nel corpo.

WELIREG può aiutare a tenere sotto controllo alcuni tumori associati alla malattia di Von Hippel-Lindau (VHL) nonché alcune forme di carcinoma renale.

In questo opuscolo vengono fornite informazioni su WELIREG, sui possibili effetti collaterali e sul sostegno di cui si può usufruire durante il trattamento. Questo opuscolo non sostituisce una visita medica, ma ha lo scopo di aiutare a prendere la migliore decisione terapeutica possibile insieme al proprio medico.

Il trattamento dei tumori può rappresentare una sfida. Ma lei non è sola/o. Ci sono innumerevoli risorse e organizzazioni che sono in grado di aiutarLa. Parli con il medico delle possibilità di sostegno disponibili e cerchi il confronto con altre persone colpite.

Ci auguriamo che questa brochure Le dia il coraggio di affrontare le sfide poste dalla Sua malattia e Le auguriamo ogni successo nel trattamento con WELIREG.

Con i migliori auguri

Il Suo team MSD
Merck Sharp & Dohme AG, Lucerna, Svizzera


Indice

Come viene assunto WELIREG?	Pagina 5
Consigli per il trattamento con WELIREG	Pagina 6
Cosa si deve osservare prima di assumere WELIREG?	Pagina 7
Gravidanza e contraccezione durante il trattamento con WELIREG	Pagina 9
Quali effetti collaterali può causare WELIREG?	Pagina 10
La tessera paziente su WELIREG	Pagina 11



Come viene assunto WELIREG?

La posologia raccomandata di WELIREG è:



120 mg (tre compresse da 40 mg) da prendere ogni giorno alla stessa ora, **con o senza cibo**.

Che cosa si deve osservare durante l'assunzione di WELIREG?



Prendere WELIREG esattamente secondo la prescrizione medica.



Assumere la dose raccomandata dal medico una volta al giorno alla stessa ora. È possibile che il medico modifichi la Sua dose raccomandata.



Non masticare e non schiacciare le compresse in pezzi più piccoli, ma inghiottire ogni compressa intera.

Se dimentica di prendere WELIREG o se ha assunto troppe compresse

- Se dimentica di prendere una dose di WELIREG, la assuma il più presto possibile il giorno stesso. Prenda poi la dose successiva di WELIREG all'ora abituale il giorno dopo. Non assuma alcuna compressa aggiuntiva per compensare la dose dimenticata.
- Non prendere una dose aggiuntiva di WELIREG se ha vomitato dopo l'assunzione del medicamento. Prenda la dose successiva di nuovo all'ora abituale il giorno dopo.
- Se ha assunto un numero eccessivo di compresse, chiedi consiglio al Suo medico o in ospedale. Potrebbe essere necessario un trattamento medico.

Consigli per il trattamento con WELIREG

Le esperienze individuali con l'assunzione di WELIREG sono molto diverse. Tuttavia, i seguenti suggerimenti potrebbero risultare utili.



Non esitare a segnalare qualsiasi anomalia

Informare il Suo medico se manifesta un effetto collaterale che la disturba o che non si attenua.



Se si sente stanco

Chieda aiuto quando ne ha bisogno e parli con l'équipe di cura, i Suoi amici e i Suoi parenti.




Mangiare in modo sano

Provi a mangiare 2–3 porzioni di frutta e verdura al giorno e a evitare cibi ad alto contenuto di grassi.



Cercare di rimanere in attività

Chiedere all'équipe di cura come si possono inserire attività che fanno del bene.



Che cosa si deve osservare prima di assumere WELIREG?

Consultare il Suo medico o il Suo farmacista prima di assumere WELIREG nei seguenti casi:

- se ha disturbi respiratori
- se ha problemi cardiaci
- se ha un basso numero di globuli rossi nel sangue (anemia)
- se è in trattamento con principi attivi stimolanti l'eritropoiesi (ESA) per il trattamento dell'anemia
- se è in gravidanza o ha intenzione di iniziare una gravidanza

WELIREG può influenzare il meccanismo d'azione di altri medicinali. Tra cui, per esempio, i seguenti:

- contraccettivi ormonali quali desogestrel, etinilestradiolo e levonorgestrel. La somministrazione concomitante di WELIREG può causare un fallimento contraccettivo o un aumento dei sanguinamenti intermestruali.
- sonniferi con il principio attivo midazolam. La somministrazione concomitante di WELIREG può ridurre l'effetto del midazolam.

Il Suo medico deciderà se la Sua dose deve essere adeguata.



Gravidanza e contraccezione durante il trattamento con WELIREG

Potenziale danno al nascituro

Il trattamento con WELIREG durante la gravidanza può danneggiare il nascituro.

Per le donne che potrebbero rimanere incinte

- Prima di avviare il trattamento con WELIREG, il Suo medico La sottoporrà a un test di gravidanza.
- Durante il trattamento con WELIREG e per almeno 1 settimana dopo l'assunzione dell'ultima dose si deve utilizzare una forma efficace di contraccezione non ormonale.
- È possibile che i metodi contraccettivi ormonali (quali pillola anticoncezionale, iniezioni o cerotti transdermici) abbiano un'efficacia limitata durante il trattamento con WELIREG.
- Parli con il Suo medico dei metodi contraccettivi che possono essere adatti nel Suo caso durante il trattamento con WELIREG.
- Informi immediatamente il Suo medico se durante il trattamento con WELIREG inizia una gravidanza oppure ritiene di poter essere incinta.

Per i pazienti di sesso maschile con partner che potrebbero iniziare una gravidanza

- Durante il trattamento con WELIREG e per almeno 1 settimana dopo l'assunzione dell'ultima dose dovrebbe utilizzare una forma efficace di contraccezione.
- Informi immediatamente il Suo medico se durante il trattamento con WELIREG la Sua partner inizia una gravidanza o ritiene di poter essere incinta.

WELIREG può causare problemi di fertilità negli uomini e nelle donne, il che significa che la capacità di avere figli può essere compromessa. In caso di dubbi al riguardo, ne parli con il Suo medico.

Quali effetti collaterali può causare WELIREG?

Come tutti gli altri medicinali, anche questo medicinale può causare effetti collaterali. Peraltro tali effetti non si manifestano in tutti i pazienti.

Freuenza	Effetto collaterale
Molto comune (>1 persona trattata su 10)	<ul style="list-style-type: none">• Ridotto numero di globuli rossi (anemia)• Stanchezza/spossatezza• Capogiro• Respirazione difficoltosa• Nausea• Livelli di ossigeno nel sangue insolitamente bassi• Cefalea• Problemi di evacuazione (stipsi)• Valori epatici aumentati• Dolori ai muscoli, alle ossa o alle articolazioni
Comune (1–10 persone trattate su 100)	<ul style="list-style-type: none">• Aumento del peso corporeo• Zuccheri ematici aumentati• Pressione arteriosa aumentata• Visione offuscata• Eruzione cutanea dolorosa con vescicole ripiene di liquido, causata dallo stesso virus che provoca anche la varicella (herpes zoster)• Caduta• Fratture ossee
Non comune (1–10 persone trattate su 1000)	<ul style="list-style-type: none">• Distacco retinico o occlusione di una vena dell'occhio (alterazioni della vista, tra cui la visione di piccoli punti neri e lampi, riduzione dell'acuità visiva)

Se si manifestano uno o più degli effetti collaterali sopra menzionati, parlarne con il Suo medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo opuscolo.

Tessera paziente su WELIREG

Osservazione di effetti collaterali

È importante saper osservare e riconoscere segni e sintomi di malattia.

Se manifesta qualsiasi sintomo durante o dopo il trattamento con WELIREG, contatti il Suo medico o consultarlo immediatamente. Tenga presente che gli effetti collaterali possono verificarsi anche dopo l'ultima dose di WELIREG.

Non cercare di diagnosticare o trattare personalmente gli effetti collaterali.

È importante che informi il Suo medico non appena compaiono dei disturbi. Portare sempre con sé la tessera paziente su WELIREG, contenente i dati di contatto del Suo medico curante, in modo da poterlo raggiungere in caso di emergenza.

La tessera paziente contiene importanti informazioni su sintomi da comunicare immediatamente al medico curante o al personale qualificato quando si è in viaggio. Le informazioni sul Suo trattamento con WELIREG contenute nella tessera possono essere utili anche ad altri medici.

Questo opuscolo è stato consegnato da

Timbro dello studio medico

CH-BEL-00006, 07/2025

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA e le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.